

EWMM NEDERLAND

WWW.EWMM.NET

Quick Scan diagnostisering KISS I – KISS II

Kopgewrichten Invloed bij
Symmetrie Stoornissen en Dyspraxie – Dysgnosie

KISS I gefixeerde rotatie / lateroflexie caput	KISS II gefixeerde retroflexie caput
Obligate kenmerken	Obligate kenmerken
<ul style="list-style-type: none">• voorkeursohouding is asymmetrisch respectievelijk er is sprake van een torticollis• plagiocefalie pariëtaal / temporaal• ATNR-achtige houding• C-scoliose• oprichtreactie van het caput verloopt asymmetrisch respectievelijk vertraagd• achter blijven motoriek één lichaamshelft resp. extremiteiten unilateraal• omrollen naar aangedane kant komt niet respectievelijk onvolledig tot stand• kruipen verloopt afwijkend (billenschuiver)• lateroflexietest en rotatietest m.n. positief• borstvoeding unilateraal problematisch	<ul style="list-style-type: none">• overstrekken / opisthotone houding• plagiocefalie (mediaan) occipitaal• ATNR-achtige houding• oprichtreactie caput onvoldoende kwalitatief respectievelijk geheel afwezig• opgetrokken schouders• bij omrollen afzet op het achterhoofd• staat vaak al met 10 maanden• kruipt kort of niet• met name de tractietest is positief• passieve flexie cervicaal fors beperkt• borstvoeding bilateraal problematisch
Facultatieve kenmerken	Facultatieve kenmerken
<ul style="list-style-type: none">• buikliggingintolerantie• aangezichtsasymmetrie• asymmetrische bilplooï• abductie heup enkelzijdig beperkt• vegetatieve ontregeling (slik- en zuigmotoriek, obstipatie)• (in)slaapstoornissen• overmatig huilen > 3 uur per dag• zuigeling grijpt met handjes naar oortjes	<ul style="list-style-type: none">• buikliggingintolerantie• matige grove / fijne motorische ontwikkeling, houterige motoriek• in- en/of doorslaapstoornissen• uitgesproken orofaciale motore hypotonie• problemen bij borstvoeding• overmatig huilen > 3 uur per dag

Ernstige manifestatie van obligate kenmerken kan een motivatie zijn om behandeling onder de 6 weken te doen laten plaatsvinden

EWMM NEDERLAND

WWW.EWMM.NET

RICHTLIJN KISS / KIDD bij zuigelingen (vanaf 6 weken)¹⁾ en jonge kinderen

Kopgewrichten Invloed bij
Symmetrie Stoornissen Dyspraxie Dysgnosie

Zuigelingen	Vanaf ca. 2 jaar en ouder
<ul style="list-style-type: none">• voorkeurshouding / asymmetrie / torticollis• C-scoliose• overstrekken / opisthotone houding• achter blijven motoriek één lichaamshelft respectievelijk extremiteiten unilateraal• plagiocefalie temporaal / pariëtaal of occipitaal• buikliggingintolerantie• (in)slaapstoornissen• slikstoornissen / zuigstoornissen• laxatieproblemen• (ontroostbaar)huiden / krijsen• hypersensibiliteit nekregio• borstvoeding problematisch	<ul style="list-style-type: none">• asymmetrie• slechte houding / houdingsverval• druk / onrustig / onzeker• struikelen / vallen / slecht evenwicht• matige grove / fijne motorische ontwikkeling, houderige motoriek• hoofdpijn / nekpijn• slechte concentratie• snel vermoeid / snel ontstemd / woedeaanvallen• in- en / of doorslaapstoornissen <p>NB: let ook op veranderingen na val op het hoofd</p>

1) bij plagiocefalieontwikkeling en/of overmatig huilen is
onderzoek/behandeling jonger dan 6 weken gerechtvaardigd.

- Bij het zich voordoen van meer dan één van genoemde symptomen is het zinvol om de wervelkolom (in het bijzonder C0-C3) en het bekken te beoordelen op functiestoornissen.